

การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยการตัดชำ

VEGETATIVE PROPAGATION OF *AQUILARIA CRASSNA* BY STEM CUTTING

สราญอุด บุณยะเวชชีวิน¹

Sarayudh Bunyavejchewin

ABSTRACT

Stem cuttings of *Aquilaria crassna* were treated with 0, 50 and 100 ppm of idole butyric acid (IBA) for 24 hours and planted in the baskets using sterile river sand as the rooting medium. After watering, the basket was kept inside the 20 x 24 inches plastic bag and tied its top. Stem cuttings separated into two portions, tip portion and semi-hardwood portion. Each cutting consisted of two buds. Twenty cuttings were used for each treatment. The experiments were conducted in January, March, June, September and November 1993.

All treatments achieved 40-60% rooting and up to 95% rooting for semihardwood cutting in January. The control treatments in June yielded only 10-15% rooting. Number of roots per rooted cutting was increased with increasing of IBA concentration. Treatment with IBA did not conclusively improve rooting percentage (excepted in June).

บทคัดย่อ

การทดลองปักชำไม้กฤษณา ดำเนินการในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน และพฤษจิกายน 2536 การตัดกิ่งจากถิ่นไม้กฤษณา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนปลายยอด และส่วนกิ่งอ่อน (ท่อนที่ดัดจากปลายยอดลงมา ผิวถิ่นมีสีเขียวถึงสีเขียวอมน้ำตาล) ตัดกิ่งปักชำออกเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมี 2 ข้อ (ประกอบด้วยตา 2 ตา) นำกิ่งตัดชำไปแช่ชอร์โมนสังเคราะห์ IBA ที่ระดับความเข้มข้น 0, 50 และ 100 ppm นาน 24 ชั่วโมง จำนวนการทดลองละ 20 กิ่ง นำไปปักชำในตะกร้าบรรจุทรายหยาบ ที่รดน้ำจนชุ่ม หลังการปักชำนำตะกร้าทรายบรรจุลงพลาสติกขนาด 20 x 24 นิ้ว ผูกปลายถุง ภายหลังการปักชำ 6 สัปดาห์ พบรากิ่งที่ตัดชำในเดือนมิถุนายนที่ไม่ได้แช่ชอร์โมนจะมีจำนวนกิ่งออกراكน้อยที่สุด (10-15%) เมื่อเทียบกับกิ่งปักชำที่ไม่ได้แช่ชอร์โมนที่ปักชำในเดือนอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนกิ่งออกراك 35-75% กิ่งปักชำที่แช่ชอร์โมนสังเคราะห์ IBA จะมีจำนวนกิ่งออกراكใกล้เคียงกันในทุกช่วงระยะเวลาการทดลอง (40-60%) ยกเว้นการทดลองปักชำในเดือนมกราคม ที่ส่วนกิ่งอ่อนจะมีจำนวนกิ่งออกراك 65-95% จำนวนรากต่อกิ่ง (เฉพาะกิ่งปักชำที่ออกراكยาวกว่า 0.2 ซม.) จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของชอร์โมนมากขึ้น การแช่ชอร์โมนสังเคราะห์ IBA ไม่ค่อยมีผลต่อการเพิ่มจำนวนกิ่งออกراك แต่จะมีผลต่อคุณภาพของกิ่งปักชำที่ออกراك

¹ ส่วนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการ กรมป่าไม้ ชุมจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คำนำ

ไม้กฤษณาหรือไม้หอน (*Aquilaria* sp.) เป็นพันธุ์ไม้ที่เนื้อไม้มีกลิ่นหอมที่มีชื่อเดียง และมีความสำคัญที่สุดในบรรดาพันธุ์ไม้มีกลิ่นหอมทั้งหลาย ในประเทศไทยพบอยู่ 3 ชนิด คือ ไม้กฤษณา (*A. crassna*) ซึ่งพบในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ไม้หอน (*A. malaccensis*) พบรอบภาคใต้ และ ไม้กฤษณา (*A. subintegra*) พบรอบภาคตะวันออก (สมคิด, 2525) เนื่องจากไม้กฤษณาเป็นไม้หายาก (ไม่วางห้ามประเกตฯ) ส่วนของกฤษนามีราคาแพง จึงมีการลักลอบตัดไม้ชนิดนี้อย่างกว้างขวาง ประกอบกับพื้นที่ป่าธรรมชาติถูกบุกรุกทำลาย เป็นสาเหตุให้แม้ไม้กฤษณาถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ไม้กฤษณาจะไม่ออกดอกออกทุกปี ผลและเมล็ดเป็นอาหารที่สัตว์จำพวกกระรอกชอบ เมล็ดที่ร่วงหล่นมักจะถูกเชื้อรากทำลาย ดังนั้นโอกาสในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติจึงมีน้อย

ปัจจุบันมีผู้สนใจปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการกล้าไม้กฤษณาจำนวนมาก แต่เมล็ดที่ใช้เพาะมีไม่เพียงพอ จึงทำให้กล้าไม้กฤษนามีราคาค่อนข้างแพง การขยายพันธุ์ไม้กฤษณาโดยไม้อาศัยเพศ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มปริมาณกล้าไม้ให้มากขึ้นได้ การตัดชำเป็นวิธีการหนึ่งของการขยายพันธุ์โดยไม้อาศัยเพศซึ่งมีการทำนานา กับพันธุ์ไม้ป่าในเขตโซนร้อนชื้นค่อน ๆ หลายชนิด เช่น ประดู่แดง (*Nanda* และคณะ, 1968; Spain และ Roy, 1981) *Dalbergia latifolia* (Negi, 1982) ซื้อ (Zakaria และ Ong, 1982) พันธุ์ไม้วังค์ยางหลายชนิด

(Momose, 1978; Srivatana และ Penguang, 1981; และ Kajornsrichon, 1994) และสัก (Nautiyol และคณะ, 1992) ความสำคัญของการตัดชำคือการออกราก หากกิ่งปักชำมีการออกรากมาก รากมีความแข็งแรง อัตราการroot ตายของกิ่งปักชำจะสูงไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษารังนี้ เพื่อเปรียบเทียบการออกรากของกิ่งปักชำของไม้กฤษณา (*A. crassna*) ที่ใช้ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ IBA ต่าง ๆ

วิธีการศึกษา

ใช้กล้าไม้กฤษณา (*A. crassna*) ซึ่งเพาะจากเมล็ดอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน จำนวน 48 กล้า เป็น stock plant กิ่งปักชำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกิ่งปลายยอด (กิ่งท่อนปลายที่มีตาข่ายดัดติดอยู่) และส่วนกิ่งอ่อน (ส่วนที่ถัดจากท่อนปลายยอดลงมา ผิว กิ่งเป็นสีเขียวถึงสีเขียวอมน้ำตาล มีตาข้างที่ง่ามใบ) การตัดกิ่งปักชำจะตัดเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนมี 2 ข้อ (ประกอบด้วยตา 2 ตา) นำกิ่งที่ตัดชำไปแช่ในฮอร์โมนสังเคราะห์ indole butyric acid (IBA) ความเข้มข้น 0, 50 และ 100 ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง. จำนวนความเข้มข้นละ 20 กิ่ง

นำกิ่งที่แช่ฮอร์โมนไปปักชำในตะกร้าพลาสติกขนาด 25 x 32 x 8 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) พื้นตะกร้ากรุด้วยกระดาษ บรรบุหิ穷ที่อบผ่าเชื้อแล้วหนา 7 เซนติเมตร รดด้วยดินชุ่มน้ำ กิ่งปักชำกิ่งท่านูมประมาณ 45° ลีกประมาณ 1-2 เซนติเมตร นำตะกร้าเพาะชำบารุงลงในถุงพลาสติกขนาด 20 x 24 นิ้ว ผูกปลายถุงให้แน่น นำไปวางไว้ในเรือนเพาะชำที่มีแสงรำไร โถงปลายถุงให้

ตั้งอยู่เสมอ

เมื่อครบ 6 สัปดาห์ ทำการขุดกิ่งปักชำไปล้างน้ำ นับจำนวนกิ่งที่ออกراك กิ่งที่มีชีวิต วัดขนาดความยาวรากของแต่ละกิ่งที่ออกراك (เฉพาะกิ่งที่ออกراكยาวกว่า 0.2 เซนติเมตร) ด้วย vernier

การศึกษารังนี้ดำเนินการตัดชำในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน และพฤษจิกายน 2536 โดยดำเนินการศึกษาที่ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลและวิจารณ์

ฤทธิภาพกับการออกراكของกิ่งตัดชำ

จำนวนกิ่งตัดชำที่ออกراكของแต่ละช่วงเวลา การปักชำแสดงไว้ใน Table 1 กิ่งตัดชำที่ไม่ได้แซ่ออร์โนนสังเคราะห์ IBA ที่ทำการตัดชำในเดือนมิถุนายน ทั้งส่วนกิ่งปลายยอด และส่วนกิ่งอ่อน มีจำนวนกิ่งตัดชำออกมากน้อยที่สุดเพียง 10-15% เมื่อเปรียบเทียบกับกิ่งตัดชำที่ไม่ได้แซ่ออร์โนนในเดือนกันยายน พฤศจิกายน และมกราคม (35-60%) (ยกเว้นการตัดชำในเดือนมีนาคม ซึ่งจะกล่าวในภายหลัง) ทั้งนี้อาจเนื่องจากในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ ปริมาณธาตุอาหารถูกนำไปใช้ในกระบวนการเพื่อการเจริญเติบโต จึงมีปริมาณธาตุอาหารสะสมเพื่อการออก rak น้อย (Hartmann และ Kester, 1983) เช่นเดียวกับไม้เพาโลเนีย ซึ่งจะตัดชำได้ดีในช่วงที่ต้นไม้กำลังพักตัว ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้มีการสะสมอาหารเป็นจำนวนมาก (สมคิด, ติดต่อส่วนตัว) ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าโซนร้อนหลายชนิดจะตัดชำได้ดีในบางฤดูกาล และการตัด

ชำในบางเดือนไม่ออกراكแม้ว่าจะใช้ออร์โนนสังเคราะห์ช่วยก็ตาม เช่น ประดู่แขก (*Dalbergia sissoo*) ยมหอม (*Cedrela toona*) (Nanda และคณะ, 1968)

ผลของออร์โนนสังเคราะห์ IBA ต่อการออกراكของกิ่งตัดชำ และจำนวนรากต่อกิ่ง

การตัดชำในเดือนมิถุนายนเป็นการทดลองเดียวที่พบว่า ออร์โนนสังเคราะห์ IBA ช่วยให้มีจำนวนกิ่งตัดชำออก rak มากขึ้น โดยกิ่งตัดชำส่วนปลายยอดที่แซ่ออร์โนนสังเคราะห์ IBA 100 ppm จะมีจำนวนกิ่งออกراك 60% เมื่อเปรียบเทียบกับกิ่งตัดชำที่ไม่ได้แซ่ออร์โนนจะมีจำนวนกิ่งออกراكเพียง 10% สำหรับส่วนกิ่งอ่อนที่แซ่ออร์โนน 50 และ 100 ppm จะมีจำนวนกิ่งออกراك 50-55% โดยกิ่งตัดชำที่ไม่ได้ใช้ออร์โนนจะออก rak เพียง 15% เท่านั้น ซึ่งการที่กิ่งตัดชำในช่วงกลางฤดูฝนออก rak น้อย น่าจะจากการสะสมธาตุอาหารเพื่อการออก rak มีน้อยแล้ว ยังอาจเนื่องจากปริมาณออกซินตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ หรือไม่สมดุล ออร์โนนสังเคราะห์ IBA จะเข้าไปช่วยเสริม เพื่อชักนำให้เกิดการออก rak มากขึ้น

ส่วนการทดลองปักชำในเดือนมกราคม กันยายน และพฤษจิกายน พบว่ากิ่งตัดชำทั้งส่วนปลายยอดและส่วนกิ่งอ่อนที่ไม่ได้แซ่ออร์โนน และกิ่งที่แซ่ออร์โนนสังเคราะห์ IBA ทั้ง 50 และ 100 ppm ของแต่ละการทดลอง จะมีจำนวนกิ่งออก rak ใกล้เคียงกัน ยกเว้นส่วนปลายยอดที่แซ่ออร์โนน 100 ppm ที่ตัดชำในเดือนมกราคม จะมีจำนวนกิ่งออก rak เพียง 20% เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าการตัดชำส่วนกิ่งอ่อนในเดือนมกราคม จะมี

Table 1. Rooted cutting, number of roots per rooted cutting, length of root per rooted cutting and none rooted living cutting material of *Aquilaria crassna*

Time of cutting		Tip portion			Semi hardwood		
		IBA conc. (ppm)			IBA conc. (ppm)		
		0	50	100	0	50	100
28 Jan 1993	I (%)	50	45	20	75	65	95
	II (%)	40	45	15	65	65	95
	III ($\bar{x} \pm SD$)	2.6 ± 1.6	7.7 ± 7.7	7.7 ± 6.2	3.2 ^{a,b} ± 1.4	6.8 ^{a,b} ± 4.5	14.0 ^a ± 5.6
	IV ($\bar{x} \pm SD$)	2.2 ± 1.4	2.0 ± 1.9	2.8 ± 2.0	2.6 ± 2.0	2.2 ± 1.5	2.2 ± 1.5
	V (%)	100	100	75	100	100	100
18 Mar 1993	I (%)	0	0	0	0	50	15
	II (%)	0	0	0	0	35	5
	III ($\bar{x} \pm SD$)	0	0	0	0	3.7 ± 2.0	3.0 ± 0.0
	IV ($\bar{x} \pm SD$)	0	0	0	0	1.7 ± 0.8	0.6 ± 0.3
	V (%)	90	80	70	80	90	50
10 Jun 1993	I (%)	10	15	60	15	55	50
	II (%)	5	10	55	10	55	45
	III ($\bar{x} \pm SD$)	3.0 ± 0.0	1.0 ± 0.0	4.3 ± 2.5	1.0 ± 0.0	3.4 ± 3.0	7.3 ± 5.1
	IV ($\bar{x} \pm SD$)	0.7 ± 0.2	1.7 ± 1.2	1.8 ± 1.2	0.2 ± 0.0	2.5 ± 1.4	2.2 ± 1.4
	V (%)	100	95	100	100	100	100
7 Sep 1993	I (%)	60	60	55	45	40	40
	II (%)	60	50	55	40	30	35
	III ($\bar{x} \pm SD$)	3.1 ^{c,d} ± 1.9	7.6 ^e ± 4.5	8.3 ^d ± 5.7	3.9 ^e ± 1.9	9.7 ^f ± 5.0	17.1 ^{e,f} ± 7.4
	IV ($\bar{x} \pm SD$)	1.4 ± 1.1	1.6 ± 1.3	1.2 ± 0.8	2.0 ± 1.4	1.4 ± 0.7	1.5 ± 0.7
	V (%)	100	100	85	75	45	65
18 Nov 1993	I (%)	35	40	40	40	60	40
	II (%)	15	40	20	25	25	30
	III ($\bar{x} \pm SD$)	3.0 ± 1.6	3.4 ± 3.6	4.8 ± 3.8	2.6 ± 0.8	5.2 ± 4.2	9.7 ± 5.7
	IV ($\bar{x} \pm SD$)	0.8 ± 0.7	0.7 ± 0.6	0.8 ± 0.4	0.8 ± 0.7	1.1 ± 0.7	1.4 ± 0.6
	V (%)	100	100	100	95	75	40

Note : I = rooted cutting

II = rooted cutting with root length longer than 0.2 cm

III = no. of roots per II

IV = length of root per II

V = none rooted living cutting materials

: same letter-subscription are significantly difference ($p < 0.05$) according to Newman - Keuls multiple range test with unequal sample sizes (Zar 1974).

จำนวนกิ่งอกรากค่อนข้างสูง (65 - 95%) เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองอื่น สาเหตุของความผันแปรของจำนวนกิ่งอกรากอาจเนื่องจากความผันแปรของ stock plant แต่ละต้น ตำแหน่งกิ่งที่ตัดชำ

ความสมบูรณ์ของ stock plant และอายุของ stock plant (Hartmann และ Kester, 1983)

จำนวนรากเฉลี่ยต่อ กิ่ง (เฉพาะกิ่งที่อกรากยาวกว่า 0.2 เซนติเมตร) (Table 1) มีแนวโน้ม

ค่อนข้างชัดเจนว่า จำนวนรากเคลื่อนที่ออกรากจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของออร์โนนสั่งเคราะห์ IBA โดยกิ่งอกรากที่ไม่ได้ใช้ออร์โนนจะมีจำนวนรากเคลื่ยต่ำสุดจำนวนรากเคลื่ยจะเพิ่มขึ้นในกิ่งตัดชำที่ใช้ออร์โนน 50 ppm และมากที่สุดในกิ่งที่ใช้ออร์โนน 100 ppm ทั้งส่วนยอดและส่วนกิ่งอ่อน แต่เฉพาะการทดลองในเดือนกันยายนเท่านั้นที่จำนวนรากเคลื่ยต่อ กิ่งอกรากของแต่ละระดับความเข้มข้นของออร์โนนจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งส่วนยอด และส่วนกิ่งอ่อน และเฉพาะส่วนกิ่งอ่อน สำหรับการปักชำในเดือนมกราคม

เมื่อพิจารณาเฉพาะกิ่งตัดชำที่ใช้ออร์โนนพบว่าที่ระดับความเข้มข้นของออร์โนนเท่ากัน จำนวนรากเคลื่ยต่อ กิ่งอกรากของส่วนกิ่งอ่อน จะมากกว่าของส่วนปลายยอด

สำหรับการปักชำในเดือนมีนาคมกิ่งปักชำไม่ออกรากถึง 4 treatment เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการทดลอง โดยตะกร้าเพาะชำถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ในเรือนกระจก และต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกแคดส่องเก็บทั้งวัน เป็นเหตุให้อุณหภูมิภายในบุ่งปลาสติกสูงมากเกินกว่าระดับที่เหมาะสมต่อการอกราก (เกินกว่า 27°C) ทำให้มีการพัฒนาตาใบก่อนการอกราก (Hartmann และ Kester, 1983)

กิ่งตัดชำที่มีชีวิตหลังการทดลอง

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อถึงสิ้นสุดการทดลองแล้วครั้ง (6 สัปดาห์ หลังการตัดชำ) กิ่งตัดชำส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิต (75-100%) แม้ว่าจะไม่ออกรากก็ตาม ซึ่งไม่ค่อยพบในการตัดชำพันธุ์ไม้ชนิดอื่น

การที่กิ่งตัดชำยังมีชีวิตโดยไม่ออกราก อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมยังไม่เหมาะสม หรืออาจเนื่องจากความผันแปรของ stock plant ทั้งด้านอายุและความสมบูรณ์ การที่ส่วนกิ่งอ่อนที่ปักชำในเดือนกันยายน และพฤษจิกายน เหลือกิ่งที่มีชีวิตเพียง 40-75% ซึ่งน้อยกว่าการทดลองอื่น เพราะตະกร้าเพาะชำเปียกชื้นและเกินไป ทำให้กิ่งปักชำเน่า พบร่วมราศีคำจำนวนมากในตະกร้าเพาะชำเมื่อถึงสิ้นสุดการทดลอง

สรุปผล

1. ไม่กุญแจสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำหากกล้าไม่ได้ การปักชำในช่วงปลายฤดูฝน ถึงฤดูหนาว ไม่จำเป็นต้องใช้ออร์โนนสั่งเคราะห์ IBA กิ่งปักชำก็สามารถอกรากได้ ในขณะที่การปักชำในช่วงกลางฤดูฝน ถ้าไม่ใช้ด้วยออร์โนนสั่งเคราะห์จะมีจำนวนกิ่งอกรากน้อยกว่าช่วงปักชำอื่นๆ แต่ถ้าใช้ด้วยออร์โนนสั่งเคราะห์ IBA จะทำให้มีจำนวนกิ่งอกรากมากขึ้น

2. จำนวนรากเคลื่ยต่อ กิ่งปักชำ (เฉพาะกิ่งที่อกรากยาวกว่า 0.2 เซนติเมตร) จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของออร์โนนสั่งเคราะห์ IBA มากขึ้น

3. เฉพาะกิ่งปักชำที่ใช้ออร์โนนที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน ส่วนกิ่งอ่อนจะมีจำนวนรากเคลื่ยต่อ กิ่งปักชำ (เฉพาะกิ่งที่อกรากยาวกว่า 0.2 เซนติเมตร) มากกว่าส่วนปลายยอด

คำนิยม

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.สมคิด สิริพัฒนคิด ก็ ให้คำแนะนำในการศึกษา และช่วยตรวจสอบฉบับภาษาไทยชีวิทยาป่าไม้ คณานุศาตร์ มหาวิทยา-

ลัยเกษตรศาสตร์ ที่กรุงเทพฯ ใช้สถานที่ในการทดลอง โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณจากส่วนงานวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

เอกสารอ้างอิง

- สมคิด สิริพัฒน์ดีก. 2525. ไม้กฤษณา (*Aquilaria spp.*) เอกสารทางวิชาการ เล่มที่ 17 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 14 หน้า
- Hartmann, H. and D.E. Kester. 1983. Plant Propagation, Principles and Practices. 4th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
- Kajornsrichon, S. 1994. Primary study on 4-year old *Hopea odorata* vegetative propagation. Thai J. For. 13 : 50-54.
- Momose, Y. 1978. Vegetative propagation of Malayan trees. Malay. Forester. 41(3) : 219-223.
- Nanda, K.K., A.N. Purolut, A. Bala and V.K. Anand. 1968. Seasonal rooting response on stem cuttings of some forest tree species to auxin. Indian Forester 94(2) : 154-162.

- Nautiyal, S., U. Singh and K. Garumurti. 1992. Rooting response of branch cuttings of teak (*Tectona grandis*) as influenced by growth hormones and position of the cutting on the crown. Indian Forester 118(2) : 112-121.
- Negi, K.S. 1982. A note on rooting response in *Dalbergia latifolia* Roxb. cuttings by plant hormones. Indian Forester. 108(4) : 300-301.
- Spain, S.K. and B.K. Roy. 1981. A comparative study of the root forming effect of indole propionic acid (IPA), indole butyric acid (IBA) and Naphthalene acetic acid (NAA) on the stem cuttings of *Dalbergia sissoo* Roxb. Indian Forester 107(3) : 151-154.
- Zakaria, B.I. and T.H. Ong. 1982. Vegetative propagation of Yamane (*Gmelina arborea*) by stem cutting. Malay. Forester 45(2) : 282-284.
- Zar. J.H. 1974. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 620 p.